Université Paris Diderot **Économétrie**
Licence 3, 2012-2013 **Vianney Perchet - Aurélie Fischer**

T.D. 1 : Rappels et modèles économétriques

Cette séance est en grande partie consacrée aux révisions : optimisation de fonctions de plusieurs variables pour l'Exercice 1, algèbre linéaire et projections pour les Exercices 2, 3 et 4, vecteurs gaussiens pour les Exercices 5, 6 et 7. Enfin, l'Exercice 8 permet de discuter un modèle économique très simple.

Exercice 1. Soit f l'application $\mathbb{R}^p \to \mathbb{R}$ telle que

$$f(u) = {}^t uMu + {}^t vu + t$$

où M est une matrice $p \times p$ symétrique, v un vecteur de taille p fixé et t un réel fixé.

1) Montrer que $\nabla f(u) = 2Mu + v$.
2) Montrer que $\mathrm{H}f(u) = 2M$.
3) En déduire que si M est définie positive, f admet un unique minimum. Préciser en quel point ce minimum est atteint.
4) Application : déterminer l'unique minimum de la fonction

$$g(u_1, u_2) = u_1^2 + u_1u_2 + u_2^2 + 3u_1 + 2u_2 - 5.$$

Exercice 2. Soit W une matrice de taille $n \times p$.

1) Montrer que $\mathrm{Ker}(W) = \mathrm{Ker}({}^tWW)$.
2) Montrer que $\mathrm{rg}(W) = \mathrm{rg}({}^tWW)$ où $\mathrm{rg}(W)$ est le rang de la matrice W.
3) En déduire des conditions pour que $({}^tWW)^{-1}$ existe. Discuter selon les valeurs relatives de p et n.

Exercice 3. Soit P une matrice de taille $n \times n$ vérifiant $P^2 = P$.

1) Montrer que P est diagonalisable et donner ses valeurs propres et vecteurs propres.
2) Vérifier que $\mathrm{tr}(P) = \mathrm{rg}(P)$ où $\mathrm{tr}(P)$ est la trace de la matrice P.
3) Supposons de plus que ${}^tP = P$. Quelle propriété supplémentaire P vérifie-t-elle alors ?

Exercice 4. Soit la matrice suivante, de taille $n \times n$:

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{n} \end{pmatrix}.$$

1) Vérifier que P est une matrice de projection orthogonale.
2) Déterminer l'espace image de P.
3) Application en statistique : on demande à n travailleurs leur salaire mensuel, on stocke les résultats dans le vecteur $x = {}^t(x_1, ..., x_n)$ (x_1 est le salaire du premier, etc...). On note $\overline{x}$ le salaire moyen de l'échantillon

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

et σ_x l'écart-type

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}.$$

Montrer que

$$\sigma_x = \frac{\|(I-P)x\|}{\sqrt{n}}.$$

Exercice 5. Soit X un vecteur aléatoire dans $\mathbb{R}^n$ de loi $\mathcal{N}(0, I_n)$. Soit Q une matrice orthogonale (i.e. ${}^tQ = Q^{-1}$). Déterminer la loi de QX.

Exercice 6. Soit X un vecteur aléatoire dans $\mathbb{R}^2$ de loi :

$$X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}\right)$$

avec $\rho \in [0,1]$. Montrer que les deux variables aléatoires $X_1 + X_2$ et $X_1 - X_2$ sont indépendantes.

Exercice 7. Soit

$$X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}\right) = \mathcal{N}(m, V).$$

1) Déterminer $\mathrm{Ker}(V)$.
2) En déduire que, presque sûrement, X appartient à un sous-espace de $\mathbb{R}^3$ à déterminer.

Exercice 8. On s'intéresse ici aux modèles de consommation individuelle inspirés de la théorie keynésienne : pour chaque ménage, la consommation C est une fonction croissante du revenu Y, $C = F(Y)$.

1) Un économiste propose trois modèles, (M1) $C = \alpha Y$, (M2) $C = \beta Y^2$ et (M3) $C = \gamma\sqrt{Y}$ (α, β et γ étant des constantes positives non précisées). Discuter du sens de chacun de ces modèles. Que penser de (M2) lorsque $Y \to \infty$? Et des trois modèles lorsque $Y \to 0$? Quelle modification proposer dans ce cas ?
2) Quelles autres variables pourraient entrer en jeu dans la détermination de la consommation ?

$$C = F(Y, ...)\,?$$